

Intézmény neve, címe, érzéstelenítést végző osztály neve, osztályvezető neve

ALTATÁSRA, REGIONÁLIS ÉS HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegünk!

Szíveskedjék az alábbi tájékoztatót elolvasni!

A tervezett műtétet megelőzően Ön először az aneszteziológiai ambulancia előkészítő munkája során, majd közvetlenül a műtét előtti napon találkozik osztályunk altatóorvosával.

A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel végezzük. Az érzéstelenítésben, a beavatkozás idején a légzés, a vérkeringés és egyéb szervek működésének fenntartásában az érzéstelenítést végző aneszteziológus orvos illetékes. Munkája a beavatkozást végző, operáló orvossal együttműködve az Ön biztonságát szolgálja.

Az érzéstelenítés különböző módszerekkel történhet.

1. Altatás (általános érzéstelenítés)

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed, és öntudatvesztéssel társul. Az alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig tartunk fenn.

A műtétet megelőzően már a kórteremben vagy az előkészítőben tablettá vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. A műtétben a kéz vénájába infúziót vezetünk be, majd az érzéstelenítést általában azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük, vagy altatógázokat adunk arcmaszka, gégemaszka, illetve a légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigén és altatógázok keverékét.

Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt, korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek az Ön alapvető élettani működésének fenntartásában.

2. Regionális, helyi érzéstelenítés

A fájdalommentesség a test operálandó/műtendő területére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem párosul.

A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza.

Gerinc közeli (spinalis vagy epiduralis) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és az alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé vagy köré. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes.

A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg, a műtét alatt nem érzi és nem képes mozgatni a beteg.

Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai, ezért mindig a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából legmegfelelőbbet javasoljuk.

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még rossz általános állapotú betegeknél is ritkák. Az általános érzéstelenítés (altatás), amely korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk.

Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:

Nagyon gyakori:

- Száraz torok
- Átmeneti zavartság, tájékozatlanság
- Hányinger, hányás
- Fejfájás
- Hátfájás

Gyakori:

- Vénagyulladás
- Erős fájdalom műtétet követően
- Átmeneti látászavar
- Szájsérülés
- Verőér véletlen szúrása központi véna biztosításakor
- Nehéz légútbiztosítás
- Remegés, hidegrázás

Kevésbé gyakori:

- Fogsérülés
- Gégegörcs
- Gépek meghibásodása
- Véletlen ébrenlét
- Légútbiztosítás kivitelezhetetlensége

Ritka:

- Gyógyszerallergia
- Szívmegállás
- Halálozás

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG stb.) folyamatosan ellenőrizzük.



A regionális, helyi érzéstelenítés mellékhatásai

A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az esetlegesen előforduló idegsérülések ritkák.

Gyakori:

- Fejfájás
- Átmeneti vizeelési zavar

Kevésbé gyakori:

- Derékfájás
- Tályog epiduralis kanülálást követően
- Központi idegrendszer görcsei
- Szívmegállás

Nagyon ritka:

- Alsó testfél bénulása
- Gerinchártya bevérvése
- Halálozás

Azokat a problémákat, amelyek Önnél nagyobb eséllyel fordulhatnak elő, az altatóorvos mondja el részletesen az első találkozásuk alkalmával.

Kérjük, hogy a műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket:

- A műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon! A pontos időpontot altatóorvosa határozza meg.
..... órákor még ihat folyadékot,
..... órákor még ehet könnyen emészthető ételt.
- Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el!
- Ékszereit vegye le, mossa le a körömlakkot, szemfestéket!
- Testékszereit (piercing) távolítsa el!
- Kérdezzen!

Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti találkozásakor!

Igazolom, hogy a fenti tudnivalókat tudomásul vettem.

Dátum: _____ év _____ hónap _____ nap

a felvilágosítást végző
aneszteziológus orvos aláírása

a kérdőívet kitöltő beteg,
illetve törvényes képviselője
vagy a nyilatkozattételre jogosult
cselekvőképes személy aláírása

