



## EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tagozata

Elnök: Dr. Füleddi Béla egyetemi tanár

Tagok: Dr. Gál János egyetemi tanár, Dr. Nagy Géza Főiskolai tanár

**Prof. Kásler Miklós**  
**Miniszter Úrnak**  
**Emberi Erőforrások Minisztériuma**

Igen Tisztelt Miniszter Úr!

Hivatkozva Miniszter Úrnak az „Egészségügy újraindításának következő fázisára való felkészülés” című, IV/4499/2020/ESZHAT iktatószámú levelére az alábbiakban küldöm az Egészségügyi Szakmai Kollégium Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tagozata által kidolgozott és a kibővített vezetősége által támogatott eljárásrendet.

### **Az aneszteziológia és intenzív terápia eljárásrendje az elektív ellátások fokozatos visszaindításának idejére**

- 1. Préaneszteziológiai konzultáció/aneszteziológiai ambulanciák működése:** feltételezhető, illetve feltételül szabható, hogy az aneszteziológiai ambulanciákon a sebészi indikáció megszületését követően, prétriázsolt, COVID-fertőzöttség szempontjából alacsony rizikójúnak tekintett betegek jelennek meg. Az alábbi szempontok merülnek fel az ambulancia működtetése során:
  - a. Egy beteget maximum egy személy kísérhet
  - b. A betegek vizsgálata lehetőleg előjegyzési időpontban (átlagosan 20 perces időpontonként) történjen
  - c. Amennyiben a várakozó helyiség több ambulanciát is kiszolgál, az előjegyzett beteg számát úgy kell összehangolni, hogy a biztonságos távolságot a betegek várakozása során tartani lehessen.
  - d. A betegek és hozzátartozóik orrot és szájat fedő maszkban várakozzanak.
  - e. A vizsgálat során mind a beteg, mind az ellátószemélyzet orrot és szájat fedő maszkot viseljen.
  - f. A dokumentáció epikrízis részében az aneszteziológiai javaslatok mellett részletes javaslatot kell közölni a beteggel a befekvés időpontjáig történő időszakokra vonatkozó izolációs és infekciókontroll teendőkről is.
- 2. Anesztézia:** valamennyi légútbiztosítással járó általános anesztézia COVID terjedés szempontjából magas kockázatúnak tekintendő. Ennek megfelelően az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges:
  - a. **Elektív műtétek** esetén:
    - i. Tünetmentes beteg + a prétriázs kérdőív negatív + a várólistán előjegyzett beteg nyilatkozatot tesz, hogy nem volt COVID-rizikóval érintett környezetben az elmúlt 14 napban: ahol megoldható, 3 napon

- belüli negatív PCR lelet álljon rendelkezésre. Ahol a PCR tesztelés nem megoldható: FFP2 maszk, arcvédő, és nem vízlepergető műtői köpeny viselése. (A preferált az elektív műtétek előtt a negatív szűrőteszt. Az, hogy ezt mennyire lehet generalizáltan előírni az ellátás során, a rendelkezésre álló tesztek számától és a tesztelés helyi szervezési szempontjaitól függ).
- ii. Ha a prétriázs során gyanú merül fel, mindenképpen ragaszkodni kell negatív PCR lelethez elektív műtétek esetén. Ennek pozitivitása esetén a műtét vagy dedikált COVID-műtői körülmények között végezhető, vagy halasztandó, amíg negatív nem lesz a beteg PCR tesztje.
  - b. **Sürgős műtét, ismeretlen, vagy bizonytalan COVID státusz**, de nincs, vagy nem nyerhető adat a COVID expozícióra: kötelező a PCR mintavétel a műtét előtt. Az általános anesztéziában végzett műtéti narkózis teljes védőfelszerelésben végzendő, a posztoperatív időszakban a beteg elkülönítendő, míg a PCR eredmény meg nem érkezik.
  - c. **Posztoperatív őrzés/megfigyelés**: azokra az esetekre, akiknél a (sürgős) műtét megkezdésekor nem áll rendelkezésre PCR teszt eredmény, a teszt negativitásának igazolódásáig „szürke zónának” megfelelő izolációs elhelyezést kell kialakítani posztoperatív őrzés céljából.
3. **Intenzív terápia**: intenzív terápiás szempontból a COVID-járvány időszakának megfelelő szabályok továbbra is érvényben maradnak.
- a. Amennyiben a beteg COVID-19 pozitív, az ellátóhely szerint illetékes COVID-intenzív osztály felelős az ellátásért.
  - b. Ismeretlen COVID-státuszú, intenzív ellátást igénylő beteg esetén törekedni kell a prétriázs információinak beszerzésére, és minél előbb kötelező a mintavétel PCR tesztre. A teszt eredményének megérkezéséig a beteget lehetőleg izolációs körülmények között kell elhelyezni, ellátását -amennyiben megoldható- dedikált személyzet végezze. A teszt pozitivitása esetén COVID-intenzív osztályra áthelyezés szükséges. Amennyiben legalább 1 PCR teszt negatív, az izoláció megszüntethető.
  - c. Amennyiben a beteg az intenzív osztályos felvétele előtt 72 órával rendelkezett negatív COVID PCR tesztel, a megszokott körülmények között elhelyezhető intenzív osztályon.

Minden további kérdésben készséggel állunk Miniszter Úr rendelkezésére.

Debrecen, 2020. május 11.

Tisztelettel:

Dr. Fülesdi Béla  
egyetemi tanár  
a Szakmai Kollégium tagozatának  
elnöke