



MSZNET

A MAGYAR SZÜLÉSZETI
ÉS NŐGYÓGYÁSZATI ENDOKRINOLÓGIAI
TÁRSASÁG (MSZNET)

SZIMPÓZIUMA

A progeszteron
és a gesztagének szerepe
a szülészeti és nőgyógyászati
endokrinológiában

Originális, uliprisztál-acetát tartalmú,
szájon át adható gyógyszer a közepesen súlyos-súlyos
tünetekkel járó myomák preoperatív kezelésére^{1,2}

1. J. Donezo, T.F. Tatarchuk, P. Bouchard, L. Pascanu, N.F. Zakharenko, T. Ivanova, Gy. Ungocsi, M. Mara, M.P. Jila, E. Bestel, P. Terwil, L. Osterloh and E. Loumaye: Ulipristal Acetate versus Placebo for Fibroid Treatment before Surgery. *N Engl J Med* 2012; 366: 409-420.
2. J. Donezo, J. Tomaszewski, F. Vazquez, P. Bouchard, B. Lemiszczak, F. Baro, K. Noua, L. Selvaggi, K. Sadowski, E. Bestel, P. Terwil, L. Osterloh and E. Loumaye: Ulipristal Acetate versus Levonorgestrel Acetate for Uterine Fibroids. *N Engl J Med* 2012; 366: 421-432.



1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Nőgyógyászati Marketing Osztály Telefon: 431 4455 Fax: 431 4449
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu
www.richter.hu • www.intimzona.hu • www.urologiaprogram.hu

Esmya® 5 mg tableta. Minőség és mennyiség összetétel: 5 mg uliprisztál-acetát tablettánként. **Terápiás javallatok:** Az uliprisztál-acetát a közepesen súlyos-súlyos tünetekkel járó méhfibromák preoperatív kezelésére javallott, fogamzóképes korú felnőtt nők esetében. **Adagolás és alkalmazás:** A kezelés során egy 5 mg hatóanyag-tartalmú tablettát kell szájon át bevenni naponta egyszer, legfeljebb három hónapon keresztül. Ezt a 3 hónapos kezelési periódust meg lehet ismételni egyszer. Az ismételt kezelést leg hamarabb az első kezelési periódus befejezését követő második menstruáció alkalmával lehet elkezdni. A kezeléseket mindig a menstruáció első hetében kell elkezdni. A hosszú távú biztonságossági adatok hiánya miatt a kezelés időtartama nem lehet hosszabb, mint két, három hónapig tartó kúra. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, terhesség és szoptatás, ismeretlen eredetű genitális vérzés, vagy nem méhfibroma miatti alkalmazás, méh, méhnyak, petefészek vagy emlő rosszindulatú daganata. **Gyógyszerközös hatások:** Egyidejűleg alkalmazott gyógyszerelés esetén az esetleges interakciók felismerése érdekében meg kell nézni az Esmya 5 mg tableta, illetve az egyidejűleg alkalmazott gyógyszerek alkalmazási előírásait. **Nem kívánatos hatások, mellékhatások:** amenorrhoea, endometrium megvastagodás, fejfájás, vertigo, hasi fájdalom, hányinger, akné, túlzott verejtékezés, vízközmérendszert fájdalom, uterinális vérzés, hüvelyfájdalom, kismedencei fájdalom, petefészek ciszta, az emlő érzékenysége/fájdalma, ödéma, fáradtság, emelkedett koleszterinszint a vérben. **Rendelhetőség:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek osztályának SZ alciportjára. **Fogyasztói ár:** 46 686 Ft. **TB támogatás:** 42 017 Ft. **Beteg fizet:** (90%-os támogatás esetén): 4 669 Ft (33. igénypont). 2013 február 16-tól. Forrás: www.oep.hu **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Richter Gedeon Nyrt. **Esmya törzskönyvi szám:** EU/1/12/750/001, EU/1/12/750/002. **Utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma:** 2014.06.03. A gyógyszerrel részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (www.ema.europa.eu) található. Kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! **Lezárás dátuma:** 2014.09.24.

RGD-79538/HU



MEGHÍVÓ

Egyesített Szent István
és Szent László Kórház Díszterme

TISZTELT KOLLÉGANŐ, KOLLÉGA ÚR!

A Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság (MSZNET) 2014. május 23-i vezetőségi ülésén a Társaság megújításáról, ismét aktív tudományos tevékenységéről határoztunk. Ennek jegyében szervezzük szimpóziumunkat a progeszteron és a gesztagének szerepe a szülészeti és nőgyógyászati endokrinológiában témakört felölelve. A téma mindenképpen érdekes nem csak a szülészeti és nőgyógyászati endokrinológia iránt érdeklődő, abban tevékenyen dolgozó kollégák, hanem valamennyi szülész-nőgyógyász szakorvos és rezidens, endokrinológus szakorvos, de orvostanhallgatók számára is. Az előadók a téma kiváló ismerői, részben vezetőségünk tagjai.

Felhívásunk, a Szimpózium programja megújuló honlapunkon (www.msznet.hu) is megtekinthető. A Szimpózium során egyben a megújuló MSZNET közgyűlését, tagtoborzóját is megtartjuk. Minden volt és leendő MSZNET tagot, érdeklődő kollégát szeretettel várunk és aktív részvételre buzdítunk. A részvétel ingyenes, de nagyon örülnék a részvétel előzetes jelzésének.

Kaposvár, 2014. szeptember 15.

Prof. Dr. Szilágyi András
MSZNET elnöke

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Prof. Dr. Szilágyi András
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Tel: +3630 9693710
www.msznet.hu
e-mail: szilagyi.andras@kmmk.hu

Kérjük a részvételi szándékot a fenti e-mail címen előzetesen jelezni szíveskedjenek. Részvételi díj nincs. A helyszínen lehetőség van a MSZNET-be belépni.

TÁMOGATÓINK



A PROGESZTERON ÉS A GESZTAGÉNEK SZEREPE A SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI ENDOKRINOLÓGIÁBAN

2014. október 31. 13.00-17.00

Egyesített Szent István és Szent László Kórház Díszterme
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1

PROGRAM

Üléselnök: **Prof. Bártfai György** és **Prof. Szilágyi András**

Prof. Dr. Szilágyi András (Kaposvár): A progeszteron és a gesztagének felosztása, szerepe a vérzészavarok kezelésében

Dr. Hajnáczy Károly (Budapest): A gesztagének farmakológiája

Prof. Dr. Bártfai György (Szeged): A gesztagének szerepe, jelentősége a fogamzásgátlásban

Prof. Dr. Gőcze Péter (Pécs): A gesztagének szerepe, jelentősége a menopausális hormonterápiában

KÖZGYŰLÉS, KÁVÉSZÜNET

Üléselnök: **Prof. Gőcze Péter** és **Prof. Paulin Ferenc**

Dr. Kőrösi Tamás (Győr): Progeszteron és gesztagének a meddőség kezelésében

Dr. Béres László (Budapest): Progeszteron és gesztagének a terhesség alatt

Prof. Dr. Paulin Ferenc (Budapest): Koraszülés predikció – progeszteron kezelés (kommentár)

Dr. Várbíró Szabolcs (Budapest): Progeszteron receptor modulátorok

FOGADÁS