

2015. 4. szám MAGYAR KIADÁS


Psychiatric Times

Hogyan használják a klinikusok a DSM-et?

Susan Kveskin

Ön egy széles körben használt diagnosztikai kézikönyv átdolgozására – és ezáltal vélhetően klinikai alkalmazásának javítására – készül. De semmilyen tanulmány nem készült arról, hogy ezt a kézikönyvet hogyan használják a mindennapi klinikai gyakorlatban és így nincs egyértelmű képe a kézikönyv alapvető erősségeiről és gyengeségeiről. Honnan fogja így tudni, hogy mit tegyen annak érdekében, hogy a kézikönyv végül használhatóbb legyen az olvasói számára?

Egyes kritikák szerint a kézikönyv legutóbbi ismételt kiadásának módosítása nem kívánt és súlyos klinikai következményekkel járt. Egyes állítások szerint például bizonyos diagnosztikai kritériumok módosítása az ADHD járványszerű terjedését és ennek megfelelően a stimulánsokkal kezelt gyermekek számának növekedését okozta. De mivel nagyon kevés adat áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a klinikusok többsége mennyire pontosan alkalmazza a kézikönyvben lévő diagnosztikai kritériumokat – illetve alkalmazza-e egyáltalán – hogyan változtathatja meg a kézikönyv szövegét annak érdekében, hogy ezek a következmények elkerülhetőek legyenek?



Természetesen a DMS-ről beszélünk. Mindkét fenti helyzet arra a feltevésre épít, hogy egyértelműen és pontosan ismert az, hogyan használják a DSM-et. De a bizonyítékok azt mutatják: *dr. Michael First és kollégái* (1) szerint, akik a Pszichiátria Fejlődéséért Csoport Pszichopatológiai Bizottságának (Psychopathology Committee of the Group for the Advancement of Psychiatry) tagjai, és nemrégiben jelentettek meg egy cikket a témában –,

(folytatás a 32. oldalon)

Highlights

A bipoláris zavar idegi alapjai
James Phelps

A bőrgyógyászat és a pszichiátria határterülete
Christopher S. Czapla,
Phebe Tucker

Mit jelent a betegség?
A krónikus fáradtság szindróma
Ronald W. Pies

Öngyilkosság, erőszak és a mentális betegség
Lloyd Sederer, MD