

<b>OENO:</b>	<b>32420</b>
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	<b>Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata</b>
<b>Indikáció:</b>	gyomor (duodenum) leggyakoribb betegségei (gastritis, pepticus ulcus, hegesedés, tumor, pylorus stenosis ) kimutatásában az endoscopos vizsgálatnak van vezető szerepe. Hagyományos röntgenvizsgálatot az endoscoppal nem tisztázható (funkcionális), nem elérhető (szűkület alatti) elváltozások, hiatus hernia kimutatására, ill. operált gyomor esetében végzünk.
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	
<b>Képméret:</b>	24x30 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	
<b>Felvételi követelmény:</b>	Teljes kontrasztanyagot tartalmazó gyomor és duodenum a nyelőcsőtől a proximalis jejunumig vizsgálva. A gyomor fundusa kontrasztanyaggal kitöltve, míg a test és a antrum kettőskontrasztosan ábrázolódik.
<b>Megjegyzés:</b>	Kettős kontrasztos hatást levegővel és kontrasztanyaggal érünk el. A vizsgálat után még készíthetünk álló, fekvő felvételeket a kontrasztanyag követése céljából.