

Tájékoztató az „Oswestry index”-ről

A kérdőív a 2.0 változat alapján készült / Fairbank J, Pynsent P. The oswestry disability index. Spine 2000;25:2940-53./

Pontozás : Az állítások megjelölése alapján : 0-5.
Lehetséges maximális pontszám: 50

Képlet: A pontszám „per” a maximális pontszám X 100 = ODI %

(pl. 16 pont esetén $16/50 \times 100 = 32 \%$)

Ha nincs kitöltve minden paragrafus, akkor azok pontszámával lesz csökkentve a maximális pontszám.

(pl. 16 pont esetén, de egy csoport nincs kitöltve:
 $16/45 \times 100 = 35,6 \%$)

Az értékelhető minimális változás Meade szerint 4 pont.

/Meade TW, Dyer S, Browne W, Frank AORandomised comparison of chiropractic and hospital outpatient management for low back pain: results from extended follow up.BMJ. 1995 Aug 5;311(7001):349-51./

Az értékelhető változás minimális időtartama Buerkins szerint 5 hét.

/ Beurskens AJ, de Vet HC, Koke AJ Responsiveness of functional status in low back pain: a comparison of different instruments.Pain. 1996 Apr;65(1):71-6./

Az Oswestry website : www.merc.wlv.ac.uk

Hazai validálás:

Dr. Ormos Gábor: Rehabilitációs Társaság Vándorgyűlése, 2003.09.03. Sopron