



Tudja-e?

- hogy az elektrotermikus sérülés gyakori (1-2%) laparoszópos szövődmény.
- hogy a bélsérülések csupán 60 %-t ismerjük fel műtét során,
(az esetek közel 80 %-ában konverzió (laparotomia) történik.)
- hogy a betegek 40 %-nál csak műtét utáni napokban derül ki a baj. Sőt, nem is feltétlen másnap, néha több nappal (4-10 nap) alakulhat ki peritonitis.

Elektromos kést minden műtétnél használjuk, ugyanakkor - legyünk őszinték - tudásunk meglehetősen korlátozott a működéséről, a potenciális szövődményekről és azok megelőzési lehetőségeiről.

Ennek ismeretében szervezzük

szeptember 29-én, pénteken az alábbi kerekasztal-beszélgetést:

A. terem | 14:00-15.30 | Elektrosebészet

Vezeti: Wéber György

Részvevők: Benkő Péter, Pap-Szekeres József

A csatlakozó előadások után megszólalnak a hazánkban "ér-hegesztő" készülékeket forgalmazó cégek, illetve egy-egy, általuk delegált sebész kolléga, aki beszámol a készülékkel szerzett klinikai tapasztalatairól.

A kerekasztalhoz csatlakozik az **"Elektrosebészet" gyakorlati kurzus**, melyet a közelben lévő "George Berci" Sebészeti Gyakorló és Kutató Laboratóriumunkban bonyolítunk 15:30-18:00 között, korlátozott létszámmal. Részletek: (<http://semmelweis.hu/mutettan/2016/11/28/mst-kongresszus-workshop/>)

Várjuk Önt is!