

Fokozott hypothyreosis kockázat hidradenitis suppuratívában szenvedő fiatal férfiaknál
[https://www.jaad.org/article/S0190-9622\(19\)32383-7/fulltext](https://www.jaad.org/article/S0190-9622(19)32383-7/fulltext)

Dr. Anna Figueiredo az Amerikai Bőrgyógyász társaság 2020-as kongresszusán egy endokrinológiai szempontból is érdekes tanulmányt ismertetett, miszerint a hidradenitis suppuratívában (HS) szenvedő fiatal férfiakban megnő a hypothyreosis kockázata.

Mintegy 8 millió Közép-Amerikai beteg orvosi dokumentációját tekintették át, amelyből 405 fiatal (18 és 40 év közti beteg) valamint 327 idősebb (41 és 81 év közötti) HS-ban szenvedő betegből állítottak össze egy retrospektív eset-kontroll tanulmányt.

A betegek életkor és nem függő összehasonlítását követően arra jutottak, hogy a fiatal HS-ban szenvedő férfiak hypothyreosis kockázata 3,95-szeresére nőtt, összehasonlítva a többi, más bőrgyógyászati betegségben szenvedő beteghez képest.

A hidradenitis suppurativa egy krónikus gyulladós betegség, amelynek a prevalenciája 4 % körül van az Egyesült Államokban. Egyre több evidencia utal arra, hogy ez a betegség egy immun-mediált folyamat eredménye.

Tudva levő, hogy a pajzsmirigy betegség is sokszor autoimmun eredetű, de a hidradenitis suppuratívával való kapcsolata eddig még nem volt széleskörűen vizsgálva.